

VACINAS	PROTEÇÃO CONTRA	IDADE E NÚMERO DE DOSES												
		Ao Nascer	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	12º mês	15º mês	18º mês	4-6 ANOS	14-20 ANOS
BCG	Tuberculose	DOSE ÚNICA												
Hepatite B	Hepatite B	1º DOSE	2º DOSE					3º DOSE						
DTP * DTPA	Difteria, Tétano e Coqueluche			1º DOSE		2º DOSE		3º DOSE			DOSE DE REFORÇO		DOSE DE REFORÇO	
Hib	Meningite			1º DOSE		2º DOSE		3º DOSE			DOSE DE REFORÇO			
Pólio Oral * Inativada	Poiomielite (paralisia infantil)			1º DOSE		2º DOSE		3º DOSE			DOSE DE REFORÇO		DOSE DE REFORÇO	
Rotavírus	Diarréia			1º DOSE		2º DOSE		3º DOSE						
Pneumocócica Conjugada	Meningite, Otite, Pneumonia			1º DOSE		2º DOSE		3º DOSE			DOSE DE REFORÇO			
Meningocócica C	Meningite				1º DOSE		2º DOSE			DOSE DE REFORÇO				
Influenza	Gripe							1º DOSE	2º DOSE	DOSES ANUAIS DE REFORÇO				
SCR	Sarampo, Caxumba e Rubéola									1º DOSE			2º DOSE	
Varicela	Varicela (catapora)									1º DOSE			2º DOSE	
Hepatite A	Hepatite A									1º DOSE		2º DOSE		
dT/dTpa	Difteria, Tétano e Coqueluche													DOSE DE REFORÇO
Febre Amarela	Febre Amarela	A PARTIR DOS 9 MESES (ÁREAS ENDÊMICAS)												
HPV (mulheres)	HPV (câncer do colo do útero)	A PARTIR DOS 9-10 ANOS (3 DOSES DE ACORDO COM O FABRICANTE DA VACINA)												

DR. FLAVIO AUGUSTO DA SILVA REIS - CRF/SP:40.612

## OBSERVAÇÕES

(1) Hib \* Se as vacinas Hib e DTPa forem aplicadas juntas, será feita a 4º dose

(2) Rotavírus \* A 3a Dose é indicada para quem tomou uma formulação específica nas clínicas particulares.